

- Potente Raticida Anticoagulante de última generación.
- Ratador controla todo tipo de ratas, ratones y lauchas con una sola ingestión.
- Los roedores mueren a los 5 a 8 días después de la ingesta, lejos del lugar de consumo.
- Su presentación en cebo le otorga características de alta palatabilidad y aceptación por parte de los roedores.

Recomendaciones de uso:

Coloque Ratador Bloque al encontrar signos de presencia de roedores. Utilizar guantes al manejar los cebos.

USO

LUGAR

DOSIS

Casas, edificios, instalaciones agroindustriales, molinos, lecherías, bodegas y otros.

Interior y exterior dentro de tubos cebaderos protegidos, en lugares ocultos como canaletas, alcantarillas, orillas de canales y tránsito de roedores.

Según el nivel de infestación. Para ratas colocar 2 a 4 bloques cada 5 a 10 metros lineales. Para ratones colocar 1 a 2 bloques cada 2 a 4 metros lineales.

CONSIDERACIONES:

Una vez instalados los cebos efectuar monitoreo y realizar la reposición de los bloques consumidos cada 15 a 20 días, hasta que cese el consumo.

Se preferencia disponer los bloques dentro de cajas o tubos cebaderos, para evitar que niños y animales puedan ingerir accidentalmente el producto.

PRECAUCIONES GENERALES:

- No comer, beber, masticar chiclé ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Utiliza guantes largos impermeables al manipular el producto.
- El producto debe ser manipulado por personas responsables.
- Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de alimentos y animales domésticos.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más cercano.
- No se requiere tiempo de espera para reingreso al área tratada.
- Al finalizar su aplicación, lave sus manos con abundante agua y jabón.
- Mantener alejado de niños y personas no responsables.
- No desechar en cursos de agua, lagos o ríos.
- Tóxico para organismos acuáticos, tóxico para animales domésticos y aves.
- No aplicar en peceras.



CONDICIÓN DE VENTA: VENTA GENERAL

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO



10Kg.



**BLOQUE 0,005%
EFECTIVO EN UNA SOLA DOSIS**



PLAGAS QUE CONTROLA: RATADOR BLOQUE MATA TODO TIPO DE RATAS Y RATONES URBANOS Y SILVESTRES

RATICIDA CUMARINICO DE SEGUNDA GENERACIÓN DE ACCIÓN ANTICOAGULANTE QUE CONTROLA EFECTIVAMENTE RATAS Y RATONES URBANOS Y SILVESTRES

Fecha de vencimiento:
24 meses después de la fecha de elaboración

Contenido Neto:
Número de Lote:

Composición cada 100 g de producto contiene:
Bromadiolona (*) 0,005 g - N° CAS: 28772-56-7
Benzoato de denatonio 0,001 g
Cera parafínica, mezcla de cereales, azúcar y colorante. c.s.p., 100 g.

(*) 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxiico umarina

NO INFLAMABLE / NO EXPLOSIVO / NO CORROSIVO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación gástrica, diarrea, acidosis metabólica, irritante dermal y ocular.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a beber líquidos, llamar a un médico.
En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención médica. **En caso de inhalación:** trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Si la respiración es dificultosa proporcionar oxígeno. Trasladar a un centro asistencial. **En caso de contacto con la piel:** lavar con abundante agua.

ANTÍDOTO: Vitamina K1 bajo supervisión médica.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:

Bromadiolona: Grupo químico: Cumarinas
Este Producto es clase IV OMS: Producto que normalmente no ofrece peligro.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

Rita Chile: (2) 2777 1994 (24 horas)
Point Chile: (2) 2747 1677

IMPORTADO POR:

Point Chile S.A.
Chile.

DISTRIBUIDO POR:

Point Chile S.A.
Avda. Pdte. Eduardo Frei M. N° 9950 OF. 10, Quilicura, Santiago. Chile.

MODO DE ACCIÓN: Anticoagulante.

REGISTRO ISP: P-774/16

DESTRUYA LOS ENVASES UNA VEZ VACÍO, SIN CONTAMINAR, LÁVELOS PREVIAMENTE ANTES DE DESECHAR. NO REUTILIZAR LOS ENVASES.

CLASE IV OMS - CUIDADO