

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Clorpirifós pertenece al grupo químico de los Organofosfatos.

Precauciones de Uso: Durante la preparación utilizar equipo de protección completo: delantal impermeable, botas de goma, guantes largos impermeables, antiparra y mascarara con filtro. Durante la aplicación utilizar equipo de protección completo: overol impermeable para aplicación de plaguicidas, antiparras, botas de goma, guantes largos impermeables y mascarara con filtro. Proteger la cabeza. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto, ni tampoco exponerse en forma innecesaria al producto durante su aplicación. Lavar la piel expuesta antes de comer, fumar, beber o ir al baño. Bañarse prolijamente y cambiarse de ropa, una vez terminado el trabajo con el producto. Destruir los envases, depositándolos en lugares dispuestos por las autoridades competentes.

Síntomas de Intoxicación: Dolor de cabeza, mareo, convulsiones, náuseas, vómitos, dolor abdominal, visión borrosa y sudoración.

Primeros Auxilios:

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de inhalación: Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.

En caso de ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado.

En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

Antídoto: Como antídoto utilizar Atropina por vía intravenosa.

Tratamiento Médico de Emergencia: Inyectar Sulfato de Atropina 1 ó 2 mg en casos leves y 2 a 4 mg en casos severos, repetir a intervalos de 5 a 10 minutos. Mantener la atropina por 24 a 48 horas. No administrar morfina.

Información Ecotoxicológica: No contaminar cursos de agua. El producto es Altamente tóxico para abejas, aves, peces y otras especies acuáticas.

Teléfonos de Emergencia:

Rita Chile (2) 2777 1994 Point Chile S.A. (2) 2747 1677

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

“INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS Y ELIMINAR DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTRO QUE ESTÉN DESTINADOS A CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ HACERSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

Precauciones de Almacenaje: Conserve el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible; en un lugar fresco, seco, bien ventilado, lejos del fuego, bajo techo y seguro bajo llave.

Aviso al Consumidor: Se garantiza la óptima calidad del producto y los porcentajes de ingredientes activos señalados en la etiqueta, hasta que el producto salga de nuestro control directo. No se da ningún tipo de garantía por consecuencias derivadas de la aplicación, ya que el manejo del producto es de responsabilidad absoluta del usuario.

POINTER 15 G

INSECTICIDA GRANULADO - GR

Clorpirifós (*) 15% p/p (150 g/kg)
Coformulantes, c.s.p. 100 % p/p (1 kg)
(*) fosforotioato de O,O - dietilo y O-3,5,6 triclora - 2 piridilo.

CLORPIRIFOS 15 G es un insecticida granulado utilizado para el control de insectos del suelo en los cultivos señalados en el cuadro de instrucciones de uso. No se acumula en el suelo y es un producto que no transmite olor ni sabores a los cultivos en los cuales se utiliza.

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1521

Fabricado por:
Point International Ltd.
Hand House, Gt. Rollright,
Chipping Norton
Oxford Ox7 5RE
Inglaterra.

Point Agro-China Ltd.
Wan Shi Town
Yixing, Jiangsu, 214217
China.

Número de Lote:

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto:

Importado y Distribuido por:
Point Chile s.a.
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Avda. Presidente. E. Frei Montalva N° 9950 Of. 10,
Quilicura, Santiago-Chile
Fono: (56 2) 2747 1677
Fax: (56 2) 2747 1677 anexo 106

INSTRUCCIONES DE USO

CLORPIRIFOS 15 G, es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto, ingestión e inhalación en tratamientos de presiembradora incorporado para el control de gusanos del suelo. Produce una inhibición de la Colinesterasa. No es absorbido ni translocado por la planta.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/ha	OBSERVACIONES
Remolacha, Maravilla, Maíz, Tabaco, Tomate	Gusano barrenador	10 - 20	En banda incorporar en los primeros centímetros del suelo. Realizar 1 aplicación por temporada.
	Gusano cortador	8 - 10	En banda incorporar en los primeros centímetros del suelo. Realizar una aplicación por temporada.
		10 - 15	Cobertura total: incorporar en los primeros centímetros del suelo. Realizar 1 aplicación por temporada.
	Gusano blanco	15 - 20	Para cobertura total: incorporar a 10 cm de profundidad. Realizar 1 aplicación por temporada.
Gusano alambre	9 - 20	En banda incorporar el producto entre 7 a 10 cm. Realizar 1 aplicación por temporada.	
	15	Para cobertura total: incorporar entre 7 a 10 cm de profundidad. Realizar 1 aplicación por temporada.	
Mora, Frambuesa, Arándano, Zarzaparrilla	Larvas del suelo Larvas de burrito Larvas de cabrito	10 - 20	Aplicar al suelo e incorporar con riego ligero. Realizar 1 aplicación por temporada.

Método de Aplicación: Poner **Clorpirifos 15 G** en los receptáculos para insecticidas granulares, no mezclar con los fertilizantes, para evitar una mala distribución. Para aplicaciones en cobertura total usar equipo que permitan una distribución uniforme. Incorporar de acuerdo a las indicaciones. En aplicaciones de banda, aplicar los gránulos en bandas de 15 a 18 cm. Incorporar de acuerdo a las indicaciones. Se recomienda utilizar las dosis más altas en suelos con alta infestación de la plaga.

Época de Aplicación: **Clorpirifos 15 G** se debe incorporar antes de la siembra.

Incompatibilidad: **Clorpirifos 15 G** debe ser aplicado sólo.

Compatibilidad: Se recomienda que **Clorpirifos 15 G** sea aplicado solo dentro de la tolva para insecticidas granulares de la máquina sembradora. No existe restricciones para aplicar fertilizantes en el mismo surco con **Clorpirifos 15 G**.

Fitotoxicidad: **Clorpirifos 15 G** puede causar fitotoxicidad en semillas de cucurbitáceas.

Carencias: No corresponde fijar carencias, por el modo y momento de uso del producto.

Tiempo de Reingreso: Se puede reingresar al área tratada inmediatamente después de haber sido incorporado al suelo. No corresponde restringir el ingreso a los animales, ya que el producto no está recomendado para el uso en cultivos destinados a su alimentación.



NOCIVO

